

Palavras-chave: perfil, crianças malária, Hospital Pediátrico do Lobito.

Referências bibliográficas:

- [1] Plucinski, M.M., Dimbu, P.R., Fortes, F., Murphy, S.C., Smith, N.T., Cruz, K.R., Seilie, A.M., Halsey, E.S., Aidoo, M., & Rogier, E. (2019). Malaria Parasite Density in Individuals with Different Rapid Diagnostic Test Results and Concentrations of HRP2 Antigen. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 100(5), 1202-1203. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0006>
- [2] WHO. (2020). World Malaria Report. In *Who* (Vol. 73, Issue 1).
- [3] <https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2020>.

CO66

Infertilidade feminina: aspetos sociais e psicológicos em pacientes atendidos no Hospital Geral de Benguela

Mariele Luís¹ Leonel Mendes^{1*}

¹Instituto Superior Politécnico de Benguela/DCTS, Benguela, Angola

*Autor correspondente: ✉ leonel.mendes@ispbenguela.com

Resumo

Introdução: A infertilidade é definida como ausência da concepção após 12 meses de atividade sexual sem uso de contraceptivos. Sua prevalência na população varia entre os diferentes países: entre um mínimo de 5% e um máximo de 30 de todos os casais (Cozzolino et al., 2018). **Objetivos:** Analisar a infertilidade feminina em pacientes atendidos no Hospital Geral de Benguela. **Material e Métodos:** Análise retrospectiva e prospetiva com uma abordagem quantitativa. A amostra foi de n=179 mulheres referente ao período de 2020/2021 e n=60 ao período de Maio de 2022. Foi aplicado teste Qui-quadrado de Pearson. **Resultados:** Análise de 179 casos de pacientes que afluíram as consultas de infertilidade durante o ano de 2020, cuja faixa etária que mais solicitou os serviços estava situada entre 18 a > 36 anos, sendo que entre elas a faixa etária predominante estava situada entre 21 e 35, com um tempo de relação de n=54, o correspondente a 10 anos e n= 40 que fazia referência a > 10 anos de relacionamento. Observou-se uma relação significativa entre os domínios faixa etária e tempo de relação (P valor=0,03). Ao se analisar o tipo de infertilidade e o número de partos n=46 (25,6%) não tiveram partos e foram diagnosticadas com o tipo de infertilidade primária. Entretanto mais da metade n=106 (59,2%) seu diagnóstico foi de infertilidade secundária e tiveram n=2 partos, porem as pacientes com maior número de partos n=3, apresentaram-se em menor número n=27 (15%). **Conclusão:** Entres as mulheres atendidas no Hospital Geral de Benguela nas consulta de infertilidade observou que, quanto maior for a faixa etária, maior foi é o tempo de relacionamento. Entretanto um quarto delas não teve partos e seu diagnóstico foi de infertilidade primária. Entretanto, mais da metade apresentou infertilidade secundária e as mesmas já tiveram partos.

Palavras-chave: Infertilidade feminina, aspetos sociais, aspetos psicológicos.

Referências bibliográficas:

- [1] Cozzolino, M., Domingo, J., & Soares, S. R. (2018). Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin. *Gynecological Endocrinology: The Official Journal of the International Society of Gynecological Endocrinology*, 34(2), 107–109. <https://doi.org/10.1080/09513590.2017.1380185>

CO74

Avaliação qualitativa da pesquisa de plasmodium em lâminas positivas dos pacientes atendidos na pediatria do Hospital Regional do Lobito

Paulino Calepete¹, João Cuiovola Gabriel², Ana Branco Steele^{3*}

¹Instituto Superior Politécnico de Benguela, Benguela, Angola

*Autor correspondente: ✉ ana.steele@ispbenguela.com